

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin du mois d'Août 1970

7 Août 1970

Avertissement

GRANDES CULTURES

HOUBLON

MILDIOU

Bien que les conditions climatiques que nous connaissons ne soient pas apparemment favorables au développement du Mildiou, les houblons sont à un stade de grande sensibilité à cette maladie. Afin d'assurer une bonne protection des cônes en voie de formation, nous conseillons de renouveler la protection fongicide dans la période du 10 au 14 Août. Pour éviter les résidus de Cuivre sur les cônes, il est conseillé d'avoir recours, dès à présent, à un fongicide organique de synthèse.

POMMES DE TERRE

MILDIOU

A la suite des brumes matinales enregistrées fin Juillet et en début de mois, les attaques de Mildiou ont progressé rapidement dans de nombreuses régions.

En conséquence, les opérations de défanage devront être étendues à toutes les parcelles contaminées, même faiblement, arrivant à maturité (voir notre Note du 30 Juillet).

Sur les parcelles où la maturité n'est pas achevée et dans les situations tardives (département des Vosges notamment), un nouveau traitement devra être appliqué à partir du 10 Août.

En cas d'invasion brutale de la maladie, défaner les cultures dans les meilleurs délais.

CULTURES MARAÎCHÈRES

SEPTORIOSE DU CELERI

La Septoriose se développe dangereusement dans certaines cultures de céleri. Poursuivre les traitements à une cadence assez rapprochée.

Le Responsable de la Station
D'Avvertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.

98